

檢查項目	藥物注射	檢查費用	檢查時間	檢查說明	注意事項
無痛內視鏡檢查	注射短效鎮靜 麻醉藥物	9,000 元	30 分鐘	檢查食道、胃、十二指腸、全大腸，是否有出血、腫瘤等異常病灶，並利用內視鏡做組織切片送驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前需停止使用抗凝血劑 1 週。 2. 檢查前需空腹 8 小時。 3. 切片或其他採檢費用另計。 4. 不適合對象：年齡超過 75 歲、過度肥胖、肺功能差、嚴重心臟疾病、腸胃沾黏或上呼吸道感染、發燒、對麻醉藥物過敏者。
無痛胃鏡	注射短效鎮靜 麻醉藥物	4,500 元	10 分鐘	檢查食道、胃、十二指腸，是否有發炎、出血、潰瘍、腫瘤等。發現疑似病變時，可經由胃鏡做組織切片、幽門桿菌採檢送驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前需停止使用抗凝血劑 1 週。 2. 檢查前需空腹 8 小時。 3. 切片或其他採檢費用另計。 4. 不適合對象：年齡超過 75 歲、過度肥胖、肺功能差、嚴重心臟疾病、腸胃沾黏或上呼吸道感染、發燒、對麻醉藥物過敏者。
無痛大腸鏡	注射短效鎮靜 麻醉藥物	5,500 元	20 分鐘	檢查全大腸(直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸、升結腸等)，是否有出血、腫瘤、瘻肉，發現病灶時可做組織切片送驗。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前需停止使用抗凝血劑 1 週 2. 檢查前 2 天採低渣飲食，前一天依照指示服用瀉劑。 3. 檢查前需空腹 8 小時。 4. 身體構造因人而異，少部分人無法執行全大腸鏡檢。 5. 切片或其他採檢費用另計 6. 不適合對象：年齡超過 75 歲、過度肥胖、肺功能差、嚴重心臟疾病、腸胃沾黏或上呼吸道感染、發燒、對麻醉藥物過敏者。

檢查項目	藥物注射	檢查費用	檢查時間	檢查說明	注意事項
多部位腫瘤篩檢	不需	41,200	1.5 小時	分腦部(含腦血管)、頭頸部、腹腔與骨盆腔共四大部份磁振造影掃描。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前需空腹 8 小時。 2. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 3. 不適合對象：體內有裝入金屬物品如：磁性手術夾、心律調整器及心律調整器電線、神經刺激器、骨釘與人工關節、人工內耳等，密閉空間恐懼症者、孕婦及哺乳婦女。
腦中風及頭痛篩檢	不需	18,000	1 小時	含腦部組織及腦、頸部血管篩檢，可快速準確的診斷腦部腫瘤及中風。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 2. 不適合對象：體內有裝入金屬物品如：磁性手術夾、心律調整器及心律調整器電線、神經刺激器、骨釘與人工關節、人工內耳等，密閉空間恐懼症者、孕婦。
全脊椎篩檢	不需	12,000	40 分鐘	頸、胸、腰椎磁振造影檢查	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 2. 不適合對象：體內有裝入金屬物品如：磁性手術夾、心律調整器及心律調整器電線、神經刺激器、骨釘與人工關節、人工內耳等，密閉空間恐懼症者、孕婦。

檢查項目	藥物注射	檢查費用	檢查時間	檢查說明	注意事項
攝護腺腫瘤篩檢	需注射顯影劑	12,000 元	40 分鐘	取代過去於肛門放入直腸內線圈不舒適的感覺，3T 磁振造影可以高訊號且高解析的方式，不須放置任何設備，使患者可輕鬆舒服完成此檢查。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請提供檢查日期六個月內腎功能檢驗報告：血中尿素氮(BUN) 及肌酐(Creatinine)共兩項，需於正常範圍內。 2. 檢查前需空腹 8 小時。 3. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 4. 檢查後需補充水分幫助顯影劑排泄。 5. 不適合對象：對顯影劑過敏者，體內有裝入金屬物品如：磁性手術夾、心律調整器及心律調整器電線、神經刺激器、骨釘與人工關節、人工內耳等，密閉空間恐懼症者。
腹部腫瘤篩檢	需注射顯影劑	13,200 元	1 小時	肝、膽、脾、胰、腎臟磁振造影	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 2. 檢查後需補充水分幫助顯影劑排泄。 3. 不適合對象：體內有裝入金屬物品如：磁性手術夾、心律調整器及心律調整器電線、神經刺激器、骨釘與人工關節、人工內耳等，密閉空間恐懼症者、孕婦及哺乳婦女。
低輻射胸腔電腦斷層	不需	6,000 元	10 分鐘	可提供胸部 3D 無死角高解析影像，對於肺癌、縱膈腔腫瘤及肺部疾病提供完整影像。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需著無金屬、鈕扣、圖案或裝飾物品之上衣。 2. 掃描時需閉氣五秒。 3. 不適合對象：孕婦。

檢查項目	藥物注射	檢查費用	檢查時間	檢查說明	注意事項
冠狀動脈攝影	需注射顯影劑	18,000	1 小時	提供完整 3D 心臟及冠狀動脈影像、可診斷冠狀動脈狹窄(狹心症)病灶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請提供檢查日期六個月內腎功能檢驗報告：血中尿素氮(BUN)及肌酐(Creatinine)共兩項，需於正常範圍內。 2. 檢查前需空腹 8 小時。 3. 前一天應避免食用含咖啡因的飲料，避免服用威而剛或任何類似藥物。 4. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 5. 檢查後需補充水分幫助顯影劑排泄。 6. 不適合對象：對顯影劑過敏者、密閉空間恐懼症者、孕婦及哺乳婦女、腎功能不良，甲狀腺機能亢進者。
冠狀動脈鈣化指數	不需	6,000	15 分鐘	以電腦斷層取像、重組計算，鈣化指數愈高，冠狀動脈狹窄機率愈高，對於冠狀動脈評估提供重要資訊	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 2. 不適合對象：孕婦。
正子斷層	需注射顯影劑	36,500	4 小時	全身檢查從頭至大腿中段正子斷層掃描，提早發現細小的癌細胞，可分辨良性及惡性腫瘤。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查前需空腹 8 小時。 2. 需更換衣服並移除身上任何的金屬物品：如髮夾、手錶、飾品等。 3. 糖尿病患者須控制飯前血糖於 180mg/dl 以下。 4. 檢查後需補充水分幫助顯影劑排泄。 5. 不適合對象：感冒、孕婦及哺乳婦女、血糖控制不佳、對顯影劑過敏者，密閉空間恐懼症者。