

藥物名稱		Atripla 亞翠佩	Complera 康普萊	Triumeq 三恩美	Genvoya 捷扶康
服用次數與顆數		一天一次 每次 1 顆	一天一次 每次 1 顆	一天一次 每次 1 顆	一天一次 每次 1 顆
服藥時間與注意事項		*睡前、空腹 *須每日服用	*須隨餐服用 *適用病毒量小於 10 萬者 *與制酸劑併用時要避開時間(間隔 6 小時以上) *須每日服用	*無食物限制 *避免與鈣片、鐵劑、胃乳、制酸劑同時服用(間隔 6 小時以上) *須每日服用	*須隨餐服用 *與制酸劑(含多價陽離子)及綜合維生素補充劑的服用時間(間隔 4 小時以上) *須每日服用
副作用 (一般使用者很少發生右列症狀)		紅疹(成人, 7%) 腹瀉、噁心(9%) 降低骨質密度 眩暈(8%) 頭痛(6%) 焦慮(5%) 憂鬱(9%) 作夢(超過 10%) 腎功能降低(9%) 鼻竇炎、上呼吸道感染(8%) 疲勞(9%) 肝指數異常(10%)	過敏皮疹、頭暈、頭痛；少數人可能有腎功能或骨密度下降	心肌梗塞 乳酸性酸中毒 B 型肝炎患者不適合首選 過敏反應(<1% abacavir)	噁心、腹瀉、頭痛
成效評估	持續服藥滿 1 個月	血中 HIV(愛滋病毒)病毒量至少低於治療前的 1/100			
	持續服藥滿 6 個月	血中 HIV(愛滋病毒)病毒量測不到			
	費用	持全國醫療服務卡就醫，有開立抗病毒藥物或抽血檢驗 CD4 值、病毒量，則可享優免，僅需付掛號費，若無上述醫囑，如看一般感冒、梅毒、淋病等，等同一般健保就醫需有部分負擔。			