

科學中藥複方

(一)補養劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0102 一貫煎 《柳州醫記》	北沙 3.0 當歸 3.0 麥門 3.0 枸杞 3.0 生地 8.0 川棟 2.0	6g tid	養陰疏肝。胸膜炎，肝炎，萎縮性胃炎，肋間神經痛，神經官能症。	陽虛發熱泄瀉及外感未解者，不宜。
0210 八味地黃丸 《醫方集解》	肉桂 0.2 山藥 0.9 炮附 0.2 澤瀉 0.7 熟地 1.8 牡丹 0.7 山茱 0.9 茯苓 0.7	4g tid	下腹部無力，腰部冷痛，老人腰痛，慢性腎炎，萎縮腎糖尿病，遺精，早漏，陰	孕婦慎用。
0308 小建中湯 《傷寒金匱方》	芍藥 1.6 生薑 0.8 桂枝 0.8 大棗 0.8 甘草 0.5 膠飴 1.5	6g tid	虛勞性疲勞，或腹痛，或下痢為目標，兒童體質改善，貧血症，夜尿症。	嘔者慎用。
0408 六味地黃丸 《小兒藥證直訣》	熟地 1.9 澤瀉 0.7 山茱 0.7 牡丹 0.7 山藥 1.0 茯苓 0.7	4g tid	真陰虧損，腰痛足酸，自汗盜汗，遺精便血，消渴淋瀝。	脾虛食少及便溏者慎用。
0409 天王補心丹 《世醫得效方》	生地 1.0 柏子 1.0 熟地 1.0 遠志 1.0 天門 1.0 茯神 1.0 麥門 1.0 石菖 1.0 人參 1.0 當歸 1.0 玄參 1.0 五味 1.0 丹參 1.0 桔梗 1.0 酸棗 1.0 黃連 1.0	6g tid	寧心，化痰涎，祛煩熱，滋陰養血，思慮過度，神志不寧，咽乾口燥，健忘怔忡，口舌生瘡，心悸失眠。	脾胃虛寒，胃納差，痰濕留滯者，慎用。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0507 四物湯 《太平惠民和劑局方》	熟地 1.0 川芎 1.0 當歸 1.0 白芍 1.0	5g tid	補血調經，月經不順，更年期障礙，白帶。	孕婦慎用。陰虛火旺所致月經過多崩中漏下，胎動漏紅慎用。
0508 四君子湯 《醫方集解》	人參 4.0 炙甘 1.5 白朮 4.0 茯苓 4.0	3.5g tid	陽虛氣弱，脾胃衰弱，食少泄瀉脈來細軟者。	陰虛血熱者慎用。
0520 玉屏風散 《世醫得效方》	黃耆 1.0 白朮 1.0 防風 1.0	4.5g tid	感冒，過敏性鼻炎，慢性氣管炎，小兒肝炎，蕁麻疹，腎炎。	避風寒，忌生冷，油膩飲食。
0523 右歸丸 《景岳全書》	肉桂 1.5 當歸 0.2 附子 1.5 枸杞 3.0 鹿角 0.2 熟地 6.0 杜仲 3.0 山萸 3.0 菟絲 3.0 山藥 3.0	2~3g tid	內分泌功能低下，性機能減退，精子缺乏症，慢性氣管炎，老年性赤白帶過多症，坐骨神經痛，再生不良性貧血，腎病綜合症。	陰虛火旺慎用，忌生冷。
0524 左歸丸 《景岳全書》	鹿角 3.0 熟地 6.0 菟絲 3.0 山萸 3.0 龜板 3.0 山藥 3.0 枸杞 3.0 牛膝 2.5	4g tid	滋腎水，調營養。用於慢性腎炎，不孕症，萎縮性外陰炎，再生障礙性貧血，神經衰弱，慢性腰肌勞損。	脾虛便溏，胃弱痰多者慎用。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0525 生脈散 《內外傷辨惑論》	人參 3.0 五味 1.2 麥門 1.8	4g tid	益氣生津，斂陰止汗。用於心律失常、心肌梗塞、心絞痛、低血壓、肺心病。	實證、暑熱熱邪尚感者，咳而表證未解者，不宜。
0602 百合固金湯 《醫方集解》	熟地 4.0 麥門 6.0 生地 4.0 貝母 3.0 當歸 4.0 玄參 3.0 白芍 3.0 桔梗 2.0 百合 4.0 甘草 1.5	5g tid	補肺，滋腎，治肺傷咽痛，喘嗽痰血。	脾虛便溏，食慾不振者慎用。
0804 金鎖固精丸 《醫方集解》	沙苑蒺藜 1.2 龍骨 0.6 芡實 1.2 牡蠣 0.6 蓮鬚 1.2	4.5g tid	夢精，滑精，盜汗虛煩。	心肝火旺或下焦濕熱致遺精者慎用。
0805 知柏地黃丸 (知藥八味丸) 《醫方集解》	熟地 1.8 茯苓 0.6 山茱 0.8 澤瀉 0.6 山藥 0.8 知母 0.4 牡丹 0.6 黃柏 0.4	4g tid	治相火旺盛，咽痛，勞熱骨蒸，虛煩盜汗，骨痿髓枯，尺脈大者。	脾虛便溏，消化不良者，慎用。
0807 炙甘草湯 《傷寒論》	炙甘 0.5 火麻 0.4 人參 0.3 阿膠 0.3 桂枝 0.4 生薑 0.4 生地 2.2 大棗 0.4 麥門 1.1	6g tid	傷寒，脈結帶，心動悸，發熱，盜汗，咳痰，心臟病。	胃腸虛弱或腹瀉下痢者慎用。
1005 桑螵蛸散 《本草衍義》	桑螵 1.0 茯苓 1.0 龍骨 1.0 遠志 1.0 龜板 1.0 石菖 1.0 人參 1.0 當歸 1.0	2~3g tid	心悸健忘，小便頻數。	下焦火，溺赤澀痛慎用。
1006 秦艽鱉甲湯 《衛生寶鑑》	秦艽 2.0 地骨 3.0 鱉甲 3.0 烏梅 2.0 柴胡 3.0 當歸 3.0 青蒿 2.0 知母 2.0	3g tid	風勞骨蒸，咳嗽，血枯肌瘦，肺炎，胸膜炎，盜汗，脈來細數。	

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1122 參苓白朮散 《太平惠民和劑局方》	人參 0.7 白扁 0.7 茯苓 0.5 薏苡 0.5 白朮 0.9 蓮肉 0.7 甘草 0.5 砂仁 0.5 山藥 0.7 桔梗 0.5	3g tid	治脾胃虛弱，飲食不進或吐或瀉。	高血壓及感冒熱症慎用。
1311 補中益氣湯 《脾胃論》	黃耆 1.8 柴胡 0.4 人參 0.5 生薑 0.4 炙甘 0.9 大棗 0.4 白朮 0.5 當歸 0.4 升麻 0.4 陳皮 0.4	4g tid	內傷勞倦，神經衰弱，脾胃虛弱，元氣不足，子宮後屈症等。	熱症之吐、鼻血或濕熱瀉痢慎用。
1405 酸棗仁湯 《金匱要略》	酸棗 2.8 茯苓 1.0 川芎 1.0 甘草 0.6 知母 0.6	6g tid	虛勞，虛煩不得眠，盜汗。	
1703 濟生腎氣丸 《濟生方》	熟地 1.4 茯苓 1.1 山茱 0.7 肉桂 0.2 山藥 0.7 炮附 0.2 澤瀉 0.5 牛膝 0.4 牡丹 0.5 車前 0.4	4g tid	慢性腎炎，糖尿病，神經衰弱，慢性支氣管炎等疾病。	實火，陰虛火旺，表邪未解者不宜
1803 歸脾湯 《校註婦人良方》	黃耆 2.0 人參 3.0 當歸 2.0 茯苓 3.0 龍眼 3.0 白朮 3.0 酸棗 3.0 炙甘 1.0 木香 1.0 生薑 1.0 遠志 1.0 大棗 1.0	5g tid	神經衰弱，健忘怔忡，不眠症，神經性心悸亢進症，食慾不振，胃弱，胃下垂，貧血，血尿，月經不順，遺精。	熱邪內伏，陰虛脈數者不宜。

(二)發表劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0212 九味羌活湯 《六科準繩》	羌活 4.5 生地 3.0 川芎 3.0 黃芩 3.0 防風 4.5 生薑 1.0 細辛 1.5 蔥白 1.0 白芷 3.0 甘草 3.0 蒼朮 4.5	3g tid	感冒，流行性感冒，各種熱性症。	陰虛氣弱者慎用。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0301 川芎茶調散 《和劑局方》	薄荷 2.0 細辛 1.5 川芎 3.0 荊芥 2.0 羌活 2.0 防風 2.0 白芷 2.0 甘草 1.5	2.5g tid	感冒，偏頭痛，惡風有汗，鼻塞痰盛，頭暈目眩等。	氣虛，血虛，久病者慎用。
0305 小青龍湯 《傷寒論》	麻黃 3.0 炙甘 3.0 桂枝 3.0 半夏 6.0 乾薑 3.0 細辛 3.0 白芍 3.0 五味 3.0	2.5g tid	感冒，咳嗽痰多，支氣管炎，喘息，腎炎，浮腫，胸滿，有停飲者。	風熱咳喘，虛喘慎用。孕婦慎用。
0908 柴葛解肌湯 《中國醫學大辭典》	柴胡 4.0 桔梗 2.0 葛根 4.0 白芍 3.0 石膏 5.0 甘草 2.0 黃芩 3.0 生薑 1.0 羌活 2.0 大棗 2.0 白芷 2.0	3g tid	感冒，頭痛，鼻燥，口渴，四肢煩疼，脈微洪者。	風寒表證及正氣弱者慎用。
1004 桑菊飲 《溫病條辨》	桑葉 12 杏仁 9.0 菊花 9.0 桔梗 9.0 連翹 12 葦根 18 薄荷 4.5 甘草 4.5	6g tid	風溫在肺，發熱咳嗽。	風寒感冒慎用。
1012 荊防敗毒散 《奇效良方》	荊芥 1.5 薄荷 1.5 防風 1.5 枳殼 1.5 柴胡 1.5 桔梗 1.5 前胡 1.5 茯苓 1.6 羌活 1.5 生薑 1.0 獨活 1.5 甘草 1.0 川芎 1.5	4g tid	發汗解表，散風祛濕。用於外感風寒濕邪、惡寒發熱、頭痛項強、肢體痠痛、腮腫。	忌生冷、油膩之品
1014 桂枝湯 《傷寒論》	桂枝 4.0 生薑 4.0 白芍 4.0 大棗 4.0 炙甘 2.0	2.5g tid	感冒，頭痛，發熱惡風鼻炎，流行病之初期(脈浮緩)。	外感風寒表實証不宜。
1115 麻黃湯 《傷寒論》	麻黃 5.0 杏仁 5.0 桂枝 4.0 炙甘 1.5	2g tid	感冒(無出汗)，支氣管喘息，感冒引起之發熱，頭痛，神經痛(脈浮緊)。	外感有汗、風熱慎用。熱退即止。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1314 葛根湯 《傷寒論》	葛根 8.0 炙甘 2.0 麻黃 4.0 生薑 1.0 桂枝 3.0 大棗 4.0 白芍 3.0	2.5g tid	由感冒初期之頭痛，發熱無汗，肩痛，神經痛。(脈浮緊)	溫病初起，熱重寒輕，口渴，脈浮數，舌紅者慎用。
1402 銀翹散 《溫病條辨》	金銀 12 薄荷 3.0 連翹 12 牛蒡 9.0 荊芥 6.0 桔梗 9.0 淡竹 9.0 淡豆 9.0 生甘 4.5	3g tid	溫病初期發熱無汗，或有汗不多，口渴頭痛，咽痛，脈浮數，舌尖赤	忌油膩葷腥，風寒感冒不宜。

(三)表裡劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0312 大柴胡湯 《傷寒論》	柴胡 6.0 生薑 4.0 黃芩 3.0 大棗 3.0 芍藥 3.0 大黃 1.0 半夏 3.0 枳實 2.0	6g tid	高血壓症，肝臟肥大症，慢性肝炎，膽石症，心臟性喘息，寒熱往來。	
0405 五積散 《太平惠民和劑局方》	麻黃 1.2 陳皮 2.0 白芷 1.2 厚朴 1.2 當歸 1.2 蒼朮 2.0 川芎 1.2 茯苓 2.0 白芍 1.2 乾薑 1.2 桔梗 1.2 生薑 1.2 枳殼 1.2 炙甘 1.2 半夏 2.0 肉桂 1.2	4.5g tid	惡寒，發熱，頭痛身痛，項背拘急，嘔吐腹痛，膨滿感，腳氣腫痛，月經不順，流感胃炎，婦人病等。	熱病不宜。
0710 防風通聖散 《醫方集解》	防風 1.2 芒硝 1.5 麻黃 1.2 石膏 2.0 薄荷 1.2 黃芩 2.0 川芎 1.2 桔梗 2.0 當歸 1.2 甘草 2.0 白芍 1.2 滑石 3.0 白朮 2.0 生薑 1.2 山梔 1.2 荊芥 1.2 大黃 1.5 連翹 1.2	3.5g tid	動脈硬化症，高血壓症，心臟性氣喘，痔疾，酒精中毒症，慢性腎炎，常習便秘。	體衰腹瀉者慎用，◎孕婦不宜。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1113 清上防風湯 《萬病回春》	防風 0.9 梔子 0.4 川芎 0.5 黃芩 0.5 荊芥 0.4 黃連 0.4 白芷 0.6 桔梗 0.6 連翹 0.6 枳殼 0.4 薄荷 0.4 甘草 0.3	9g tid	治顏面瘡癩熱毒，浮腫或眼充血，或酒齙鼻，清上焦火。	
1315 葛根黃芩黃連湯 《傷寒論》	葛根 6.0 黃連 3.0 黃芩 3.0 甘草 2.0	4.5g tid	細菌性痢疾，腹痛，腸炎，而有發熱者，酒客熱喘。	

(四)和解劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0307 小柴胡湯 《傷寒論》	柴胡 7.0 半夏 5.0 黃芩 3.0 生薑 4.0 人參 3.0 大棗 3.0 甘草 2.0	6g tid	往來寒熱，心煩喜嘔，胸痛，脅下痞鞭。用於肝炎，膽汁反流性胃炎，過敏性皮膚病。	
0506 四逆散 《傷寒論》	柴胡 5.0 枳實 2.0 芍藥 4.0 甘草 1.5	2g tid	和解表裏，疏肝理脾。用於肝炎，膽囊炎。	
0519 加味道遙散 《證治準繩》	當歸 3.0 煨薑 1.0 白芍 3.0 薄荷 1.0 柴胡 3.0 炙甘 2.0 白朮 3.0 牡丹 2.0 茯苓 3.0 山梔 2.0	4g tid	治肝脾血虛，遍身瘙癢，口舌生瘡，耳內作痛，胸乳腹脹，小便不利，初育產門腫脹，焮痛不閉，更年期障礙。	虛寒者慎用。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0713 抑肝散 《證治準繩》	柴胡 0.6 白朮 1.0 鉤藤 1.0 茯苓 1.0 當歸 1.0 甘草 0.6 川芎 0.8	4.5g tid	痙攣，驚悸寒熱，或發熱咬牙，或嘔吐痰涎，腹脹，食慾不振，不眠症。	
0903 柴胡加 龍骨牡蠣湯 《傷寒雜病論》	柴胡 0.5 生薑 0.5 黃芩 0.5 大棗 0.5 人參 0.5 龍骨 0.5 半夏 0.5 牡蠣 0.5 桂枝 0.5 茯苓 0.5 大黃 1.0	2~3g tid	神經衰弱，不眠症，神經性心悸亢進症，動脈硬化症，高血壓症，慢性腎炎。	
0904 柴胡清肝湯 《一貫堂方》	柴胡 2.0 桔梗 1.5 川芎 1.5 薄荷 1.5 黃芩 1.5 芍藥 1.5 連翹 1.5 黃連 1.5 天花 1.5 山梔 1.5 當歸 1.5 牛蒡 1.5 地黃 1.5 甘草 1.5 黃柏 1.5	2~3g tid	治腺腫，慢性扁桃炎，咽喉炎，皮膚病，微熱，麻疹後不調和，疝症，肋膜炎，神經質，神經症等。	
0918 柴胡疏肝湯 《景岳全書》	柴胡 1.1 陳皮 1.1 川芎 0.9 枳殼 0.9 白芍 0.9 炙甘 0.3 香附 0.9	2~3g tid	肝氣鬱滯，脅肋疼痛，往來寒熱，納少腹脹，經前痛經。	服藥過程如出現口燥咽乾，舌紅少苔心煩失眠，應停服。
1120 逍遙散 《太平惠民和劑局方》	當歸 3.0 茯苓 3.0 白芍 3.0 炙甘 1.5 柴胡 3.0 薄荷 1.0 白朮 3.0 煨薑 2.0	3.5g tid	月經不順，白帶，更年期之神經症。	

(五)理氣劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0218 十六味流氣飲 《六科準繩》	當歸 3.0 木香 2.0 川芎 3.0 烏藥 2.0 白芍 3.0 厚朴 2.0 肉桂 3.0 枳殼 2.0 人參 3.0 檳榔 2.0 桔梗 3.0 紫蘇 2.0 白芷 2.0 防風 2.0 黃耆 2.0 甘草 2.0	2~3g tid	治乳腺症，甲狀腺腫，惡瘡，癰疽，腫毒。	潰後久不癒，宜酌加補氣血藥。
0802 定喘湯 《證治準繩》	麻黃 3.0 杏仁 1.8 桑白 1.8 半夏 3.0 黃芩 0.6 白果 4.8 款冬 3.0 甘草 0.6 蘇子 1.8	3g tid	喘息，肺虛，感寒等。	內無痰熱，或哮喘日久，氣虛脈弱者慎用。
1023 烏藥順氣散 《太平惠民和劑局方》	烏藥 2.5 枳殼 2.0 麻黃 2.5 陳皮 2.5 白芷 1.5 乾薑 2.5 川芎 2.5 生薑 2.5 白殭 2.5 大棗 1.0 桔梗 2.5 甘草 1.5	3g tid	骨節疼痛，中風遍身頑麻，語言蹇滯，口眼喎斜，喉寒痰湧，步履艱難，顏面神經	孕婦不宜。
1123 旋覆花代赭石湯 《傷寒雜病論》	旋覆花 3.0 甘草 2.0 代赭 3.0 生薑 4.0 半夏 5.0 大棗 3.0 人參 2.0	2~3g tid	心下痞硬，噎氣不止，嘔吐，胃酸過多。	痞硬噎氣，舌苔厚膩証候尤為適合。
1213 越鞠丸 《丹溪心法》	香附 1.3 炮梔 1.1 蒼朮 1.3 神麴 1.1 川芎 1.3	3g tid	六鬱所致神經官能症，梅核氣，胃十二指腸潰瘍，慢性胃炎，膽囊炎，膽石症，肋間神經痛，痛經等。	使用時忌憂思惱怒。虛證鬱滯者不宜單獨使用。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
2003 蘇子降氣湯 《太平惠民和劑局方》	蘇子 3.0 陳皮 2.5 厚朴 2.5 當歸 2.5 前胡 2.5 肉桂 2.5 半夏 4.0 甘草 1.0 生薑 1.5 大棗 1.5	2.5g tid	降逆平喘，痰 涎壅盛，咳嗽 短氣，胸膈滿 悶。	肺熱壅盛之喘咳 不宜。

(六)理血劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0205 人參養榮湯 《太平惠民和劑局方》	熟地 0.3 甘草 0.5 當歸 0.5 桂心 0.5 白芍 0.8 陳皮 0.5 黃耆 0.5 遠志 0.2 人參 0.5 五味 0.3 茯苓 0.3 生薑 0.3 白朮 0.5 大棗 0.3	5g tid	治脾肺氣虛， 營血不足，驚 悸健忘，發熱 惡寒，食少無 味，身倦肌瘦 ，毛髮脫落， 肺結核等。	凡有感冒，消化 不良，煩躁不安 等症，不宜。
0211 八味帶下方 《驗方》	土茯 4.0 陳皮 2.0 金銀 1.0 茯苓 3.0 當歸 5.0 大黃 1.0 川芎 3.0 木通 3.0	2.5g tid	治膿性，惡臭 性白帶。	
0315 女科柏子仁丸 《婦人大全良方》	柏子 0.5 澤蘭 1.9 熟地 0.9 續斷 1.9 牛膝 0.5 卷柏 0.5	4.5g tid	祛瘀通經，月 經不調，血虛 有火，月經耗 損，漸至不通 ，羸瘦而生潮 熱，室女思慮 過度，經閉成 癆。	
0415 少腹逐瘀湯 《醫林改錯》	沒藥 1.5 五靈 3.0 肉桂 1.5 小茴 0.1 當歸 4.5 乾薑 0.3 川芎 1.5 延胡 1.5 赤芍 3.0 蒲黃 4.5	4g tid	活血祛瘀，溫 經止痛。痛經 ，閉經，不孕 ，子宮肌瘤， 卵巢囊腫，泌 尿系結石。	孕婦及氣虛崩漏 者不宜。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0521 正骨紫金丹 《醫宗金鑑》	丁香 2.0 當歸 4.0 木香 2.0 蓮肉 4.0 血竭 2.0 茯苓 4.0 兒茶 2.0 白芍 4.0 熟大 2.0 甘草 1.0 紅花 2.0 牡丹 1.0	3.5g tid	因跌打撲墜，閃挫損傷，引起的血瘀血凝聚，紅腫疼痛及傷筋動骨等。	孕婦不宜。
0910 保產無憂方十三味 (安胎飲) 《驗方新編》	黃耆 2.4 菟絲 3.0 川羌 1.5 厚朴 2.0 荊芥 2.4 枳殼 1.8 當歸 4.5 生薑 1.0 川芎 4.5 蘼艾 2.0 白芍 6.0 甘草 1.5 川貝 3.0	2~3g tid	治妊娠，嘔吐，痰水，心中憤悶，頭重目眩，惡聞食氣，或胎動不安，腰腹卒痛，下血不止。	可安胎，預防流產，但已產後，此藥不宜。
1015 桂枝茯苓丸 《金匱要略》	桂枝 4.0 赤芍 4.0 牡丹 4.0 茯苓 4.0 桃仁 4.0	2g tid	月經不順，月經困難，子宮出血，子宮內膜炎，子宮筋腫，血道症，卵巢機能不全，打撲症，痔疾，更年期障礙。	孕婦慎用。
1210 復元活血湯 (去穿山甲) 《醫學發明》	柴胡 1.2 紅花 6.0 當歸 9.0 桃仁 1.2 甘草 6.0 瓜樓 9.0 大黃 9.0	2.5g tid	跌打損傷，瘀血留結胸脅，痛不可忍者。	孕婦不宜。
1302 溫經湯 《金匱要略》	吳茱 1.0 牡丹 2.0 當歸 3.0 生薑 1.0 川芎 2.0 白芍 2.0 人參 2.0 甘草 2.0 桂枝 2.0 半夏 5.0 阿膠 2.0 麥門冬 5.0	4g tid	治月經不順，子宮出血，血道症，更年期障礙，虛寒不孕症，手掌煩熱。	腹滿有塊，實證瘀血者，不宜。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1308 疏經活血湯 《萬病回春》	桃仁 2.0 陳皮 1.5 生地 2.0 茯苓 2.0 當歸 2.0 防己 1.5 川芎 2.0 牛膝 1.5 白芍 2.5 威靈 1.5 羌活 1.5 龍膽 1.5 防風 1.5 生薑 1.5 白芷 1.0 甘草 1.0 蒼朮 2.0	3g tid	治痛風，漿液性膝關節炎，腰痛，坐骨神經痛，痿躄(下肢麻痺)浮腫，半身不遂，高血壓。	辛辣食物不宜。
1317 當歸芍藥散 《金匱要略》	當歸 3.0 茯苓 4.0 川芎 3.0 白朮 4.0 白芍 4.0 澤瀉 4.0	6g tid	月經不順，白帶，子宮出血，子宮後屈，慢性腎炎，腰痛，更年期綜合症，神經衰弱，心悸亢進症。	
1320 補陽還五湯 《醫林改錯》	黃耆 1.6 川芎 0.6 桃仁 0.6 赤芍 1.0 紅花 0.6 地龍 0.6 歸尾 1.0	3.5g tid	治正氣虧虛而致血脈不利之半身不遂，腦血管疾病，坐骨神經痛，腎炎。	愈後還須繼續服用防止復發。
0605 血府逐瘀湯 《醫林改錯》	當歸 0.7 紅花 0.7 桃仁 1.0 赤芍 0.5 枳殼 0.5 生地 0.7 柴胡 0.2 川芎 0.4 桔梗 0.4 甘草 0.2 牛膝 0.7	5g tid	瘀血停滯胸中而見頭痛，胸痛，痛如針刺有定處或呃逆乾嘔，內熱煩急，心悸失眠，午後潮熱，唇舌紫暗，舌有瘀點，脈弦澀等症。	孕婦不宜。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0812 抵當湯 《傷寒論》	桃仁 1.0 虻蟲 1.0 酒大 3.0 水蛭 1.0	3g tid	攻逐瘀血。用於月經閉止，月經不順，子宮筋腫，跌打損傷，脫疽，健忘症，精神分裂症。	孕婦不宜。

(七)祛濕劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0208 八正散 《太平惠民和劑局方》	山梔 3.0 扁蓄 3.0 大黃 1.0 滑石 5.0 車前 1.5 燈心 2.0 木通 3.0 甘草 1.5 瞿麥 3.0	2g tid	濕熱下注。咽乾口渴，少腹急滿，小便不通，淋痛，尿血，或因熱為腫。	體質虛弱者、孕婦慎用。
0404 五苓散 《傷寒論》	桂枝 3.0 白朮 4.5 豬苓 4.5 澤瀉 6.0 茯苓 4.5	4.5g tid	口渴，瀉痢，頭暈，頭痛，浮腫，急性腸炎，胃弱，小兒之腸炎。	體虛者可與補養脾腎之劑合用。脾氣虧損，腎氣虛弱，溫病高熱傷津慎用。
0522 甘露消毒丹 《醫效秘傳》	射干 0.4 滑石 1.5 川貝 0.5 白豆 0.4 藿香 0.4 茵陳 1.1 薄荷 0.4 木通 0.5 連翹 0.4 石菖 0.6 黃芩 1.0	2.5g tid	濕溫時疫、邪在氣分。症見發熱，倦怠，胸悶，腹脹，肢酸，咽腫，身黃，頭腫，口渴，小便短赤或淋濁，舌苔淡白或厚或干黃者。	濕熱並陰虛津虧證慎用。

方名	組成藥物/g			日用	臨床應用	注意事項
0711 防己黃耆湯 《金匱要略》	防己 5.0 黃耆 5.0 白朮 3.0	甘草 1.5 生薑 3.0 大棗 3.0		9g tid	治風濕風水關節煩疼，脈浮身重，汗出惡風，腰以下浮腫。	水腫實證而兼噁心、腹脹、便溏不宜。
0714 完帶湯 《傅青主女科》	人參 0.2 荊芥 0.05 山藥 1.0 陳皮 0.05 蒼朮 0.3	白朮 1.0 車前 0.3 柴胡 0.06 白芍 0.5 甘草 0.1		5g tid	白帶，帶下色白或淡黃，清稀無臭，面色白，倦怠，便溏，舌淡苔白，脈緩或濡弱。	肝鬱化熱，濕熱下注，而見帶下赤黃，稠黏臭穢，苔黃脈數慎用。
0811 羌活勝濕湯 《內外傷辨惑論》	羌活 1.2 獨活 1.2 川芎 0.2 甘草 0.6	防風 1.2 蒿本 1.2 蔓荊 0.4		4.5g tid	風濕上衝，頭痛，脊痛，項強。	孕婦慎用。
0916 苓桂朮甘湯 《金匱要略》	茯苓 2.0 桂枝 1.5	白朮 1.5 甘草 1.0		1.5~2g tid	眩暈，心悸亢進，神經衰弱，健脾滲濕，溫化痰飲，慢性腎炎等。	陰虛津液不足者，慎用。
1318 當歸拈痛湯 《李東垣方》	當歸 0.3 羌活 0.6 防風 0.4 升麻 0.3 葛根 0.3 黃芩 0.6 知母 0.4 甘草 0.6	人參 0.3 蒼朮 0.3 白朮 0.4 豬苓 0.4 澤瀉 0.4 茵陳 0.6 苦參 0.3		6g tid	濕熱走注，遍身骨節煩痛，肩背沉重，關節痛及一切風濕熱毒。	濕熱並有陰虛津虧慎用。忌辛辣、油膩食物。
1601 豬苓湯 《傷寒論》	豬苓 1.2 茯苓 1.2 阿膠 1.2	滑石 1.2 澤瀉 1.2		3.5g tid	尿意頻繁，血尿，腎臟結石，膀胱結石。	

(八)潤燥劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0715 沙參麥冬湯 《溫病條辨》	北沙 3.5 桑葉 2.0 麥門 3.5 玉竹 2.5 生扁 2.0 瓜樓 2.0 甘草 1.5	4.5g tid	清養肺胃。燥咳，小兒口瘡，肺炎。	
0716 杏蘇飲 (幼科) 《醫宗金鑑》	杏仁 0.3 甘草 0.1 紫蘇 0.3 麥門 0.3 前胡 0.3 浙貝 0.3 桔梗 0.3 橘紅 0.1 枳殼 0.3 生薑 0.1 桑白 0.3 黃芩 0.3	6g tid	溫散風寒，宣肺化痰。	
1104 麥門冬湯 《金匱要略》	人參 0.4 粳米 1.1 麥門 2.2 大棗 0.8 半夏 1.1 甘草 0.4	4g tid	支氣管炎，感冒，祛痰，喘息，肺結核，喘嗽。	肺痿屬虛寒者不宜
1112 清燥救肺湯 《醫宗金鑑》	枇杷 0.4 阿膠 0.5 桑葉 2.0 麥門 0.9 杏仁 0.4 胡麻 0.6 石膏 0.2 甘草 0.6 人參 0.4	3.5g tid	頭痛發熱，咳嗽無痰，氣逆而喘，咽喉乾痛，心煩口渴。	脾胃虛弱慎用，涼燥證不宜。
1117 麻子仁丸 《傷寒論》	麻子 2.0 厚朴 0.7 芍藥 0.7 枳殼 0.7 大黃 1.3 杏仁 0.7	4g tid	緩下劑，常見便秘。	孕婦不宜。體虛、年老，陰虧便秘慎用。

(九)瀉火劑-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0509 白虎湯 《傷寒論》	石膏 2.2 粳米 1.9 知母 1.4 炙甘 0.5	3.5g tid 53	治傷寒，熱痢，下重等	表證未解的無汗發熱，口不渴，脈見浮細或沉者不宜。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0101 乙字湯 《驗方》	升麻 0.5 黃芩 0.8 柴胡 1.8 大黃 0.3 當歸 1.8 甘草 0.8	6g tid	痔核，脫肛，痔出血。	
0501 玉女煎 《景岳全書》	熟地 3.1 知母 0.8 麥門 1.1 牛膝 0.8 生石 0.2	6g tid	陰虛胃火齒痛。	大便溏泄者慎用。
0512 甘露飲 《太平惠民和劑局方》	枇杷 0.6 石斛 0.6 生地 0.6 黃芩 0.6 熟地 0.6 茵陳 0.6 天門 0.6 枳殼 0.6 麥門 0.6 炙甘 0.6	4g tid	目赤腫痛，齒齦腫痛出膿，口瘡咽痛，胃中濕熱，發疹，腹滿身熱，黃疸。	忌辛辣、油膩食物。
0513 甘麥大棗湯 《金匱要略》	甘草 1.0 大棗 1.2 小麥 3.8	4.5g tid	治婦人臟躁善悲欲泣，癰症，狂症。	
0516 半夏瀉心湯 《傷寒論》	半夏 1.5 人參 0.9 乾薑 0.9 大棗 0.9 黃芩 0.9 甘草 0.6 黃連 0.3	4.5g tid	心下痞及嘔而腸鳴者，急慢性胃腸炎，胃擴張，胃潰瘍等。	陰虛嘔逆者不宜。
0705 辛夷散 《醫方集解》	辛夷 0.6 升麻 0.6 防風 0.6 川芎 0.6 白芷 0.6 木通 0.6 細辛 0.6 甘草 0.6 蒿本 0.6	7.5g tid	鼻塞，鼻生瘰肉。	孕婦不宜，忌辛辣食物。
0706 辛夷清肺湯 《外科正宗》	百合 0.8 知母 0.8 麥門 0.8 山梔 0.8 辛夷 0.5 黃芩 0.8 升麻 0.2 枇杷 0.3 石膏 0.8 甘草 0.3	3g tid	鼻塞，鼻生瘰肉。	
0907 柴陷湯 《沈氏尊生書》	柴胡 1.1 大棗 0.3 黃芩 0.5 甘草 0.3 半夏 1.6 黃連 0.5 生薑 0.3 瓜樓 1.1 人參 0.4	6g tid	治肋膜炎，肺炎，膽石，熱病胸痛，或心下痛，咳嗽。	

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1101 涼膈散 《太平惠民和劑局方》	薄荷 0.5 連翹 2.0 山梔 0.5 大黃 1.0 淡竹 0.5 芒硝 0.1 黃芩 0.5 甘草 1.0	4g tid	頭昏目赤，煩燥口渴，舌瘡，便秘。	脾胃虛寒，大便溏薄者不宜。孕婦慎用。
1106 清胃散 《蘭室秘藏》	當歸 1.2 生地 1.2 升麻 1.7 牡丹 0.9 黃連 0.9	4g tid	清胃涼血。齒痛，齒齦腫痛出血，齒齦潰爛。	
1110 清心蓮子飲 《太平惠民和劑局方》	人參 3.0 石蓮 4.0 黃耆 2.0 地骨 2.0 炙甘 2.0 茯苓 4.0 麥門 4.0 車前 3.0 黃芩 3.0	4g tid	上盛下虛。思慮憂愁，抑鬱，心中煩躁，口苦咽乾，神經衰弱，糖尿病，腎炎，白	
1207 普濟消毒飲 《東垣試效方》	黃芩 5.0 牛蒡 1.0 黃連 5.0 板藍 1.0 玄參 2.0 馬勃 1.0 柴胡 2.0 白僵 0.7 桔梗 2.0 升麻 0.7 甘草 2.0 薄荷 1.0 連翹 1.0 陳皮 2.0	3g tid	上呼吸道感染，扁桃體炎，帶狀疱疹。	忌服辛辣、刺激、油膩飲食。陰虛患者慎用。
1306 滋陰降火湯 《沈氏養生書》	熟地 2.5 白朮 3.0 生地 2.5 知母 1.5 當歸 2.5 黃柏 1.5 白芍 2.5 炙甘 1.5 天門 2.5 陳皮 2.5 麥門 2.5	5g tid	養陰涼血。咽喉乾燥，口渴，咳嗽，嘎聲。	
1401 蒼耳散 《證治準繩》	白芷 1.0 辛夷 2.0 蒼耳 2.5 薄荷 0.5	3g tid	治鼻淵，蓄膿，鼻炎。	
1604 導赤散 《小兒藥證直訣》	甘草 3.0 生地 1.5 淡竹 3.0 木通 3.0	3g tid	治心熱移於小腸，口糜舌瘡，小便赤澀，莖中作痛，熱淋不利，面赤煩燥。	忌辛辣、刺激、油膩等食物。

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1607 龍膽瀉肝湯 《李東桓方》	當歸 1.5 龍膽 2.0 甘草 1.5 澤瀉 2.0 柴胡 車前 1.5 山梔 1.5 木通 1.5 黃芩 1.5 生地 1.5	3g tid	肝經濕熱引起之耳聾耳腫，脅痛苦，小便赤澀。	脾胃虛弱者慎用。

(十)消化胃腸類-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0203 人參湯 (理中湯) 《傷寒論》	人參 3.0 甘草 3.0 白朮 3.0 乾薑 3.0	4.5g tid	慢性胃腸炎，胃弱，胃下垂。	素體陽虛、失血不宜。孕婦慎用。
0411 木香檳榔丸 《孺門事親》	木香 0.3 青皮 0.3 檳榔 0.3 枳殼 0.3 大黃 0.3 香附 1.2 牽牛 1.2 蓬莪 0.3 陳皮 0.3 黃連 0.3 黃柏 0.3	6g tid	一切滯氣，心胸腹脅，痞滿，二便瀯滯。	體虛、年老者慎用。孕婦不宜。
0503 平胃散 《太平惠民和劑局方》	蒼朮 1.7 甘草 0.9 厚朴 0.9 生薑 0.9 陳皮 0.9 大棗 0.9	4.5g tid	脾胃不能運化，食慾不振，胃炎，胃弱，胃擴張。	虛證，熱證不宜。孕婦慎用。
0601 安中散 《太平惠民和劑局方》	元胡 3.0 甘草 1.0 茴香 1.5 縮砂 1.0 牡蠣 3.0 良薑 0.5 肉桂 0.8	6g tid	神經性胃痛，吐酸水，胸脹腹滿，腹痛。	
0915 香砂六君子湯 《刪補名醫方論》	木香 0.4 白朮 1.1 砂仁 0.5 茯苓 1.1 陳皮 0.4 甘草 0.4 半夏 0.5 生薑 1.1 人參 0.5 大棗	3.5g tid	治氣虛痰飲，嘔吐痞悶，脾胃不和。	生冷食物不宜。
0919 保和丸 《丹溪心法》	山楂 2.0 橘紅 0.4 神麴 0.7 茯苓 0.7 萊菔 0.4 連翹 0.4 半夏 0.7 麥芽 0.7	2~3g tid	消化不良，胃炎，胃、十二指腸潰瘍，預防逆流性食道炎。	體虛無積滯者不宜。孕婦慎用。

(十一)除痰咳嗽類-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0202 二陳湯 《太平惠氏和劑局方》	陳皮 4.0 甘草 1.0 半夏 5.0 生薑 3.0 茯苓 5.0	4.5g tid	一切的痰飲為病。頭眩，咳嗽，嘔吐，噎心，脹滿，心悸。	咯血，吐血，津液虧損，陰虛燥咳者不宜。
0401 止嗽散 《醫學心悟》	桔梗 9.0 白前 9.0 荊芥 4.5 甘草 3.0 紫菀 9.0 陳皮 3.0 百部 9.0	4.5g tid	感冒咳嗽，支氣管炎咳嗽。	痰中帶血者慎用，陰虛勞嗽不宜。
0517 半夏白朮天麻湯 《脾胃論》	人參 1.5 蒼朮 3.0 黃耆 1.5 茯苓 3.0 白朮 3.0 澤瀉 1.5 陳皮 3.0 半夏 3.0 天麻 2.0 神麩 2.0 乾薑 1.0 麥芽 2.0 黃柏 1.0 生薑	6g tid	燥濕化痰，益氣和胃。痰厥頭痛如裂，眩暈，吐逆急，惡心煩悶，美尼爾氏綜合症。	陰虛肝陽上亢之眩暈頭痛者不宜。
1118 麻杏甘石湯 《傷寒論》	麻黃 2.0 石膏 4.0 杏仁 2.0 炙甘 1.0	2.5g tid	肺中熱盛之咳逆喘急。	
1301 溫膽湯 《中國醫學辭典》	陳皮 1.5 茯苓 0.7 枳實 0.9 半夏 0.9 竹茹 0.9 生薑 0.4 甘草 0.4 大棗 0.3	3g tid	痰氣郁結化熱証。眩暈，嘔吐，不眠，癩癩。精神病，神經官能症，胃、十二指腸潰瘍，美尼爾氏綜合症。	嘔吐呃逆，屬寒痰者，不宜。
2201 響聲破笛丸 《萬病回春》	大黃 1.0 砂仁 1.0 川芎 1.0 桔梗 2.5 阿仙 2.0 訶子 1.0 薄荷 4.0 甘草 2.5 連翹 2.5	4.5g tid	清涼除痰，消積潤燥。用於失音嗆聲，咽喉痛。	

(十二)癰瘍劑類-1

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1024 真人活命飲 (去穿山甲) 《證物準繩方》	當歸 1.0 赤芍 1.0 甘草 1.0 陳皮 3.0 防風 1.0 乳香 1.0 白芷 1.0 沒藥 1.0 天花 1.0 皂角 1.0 金銀 3.0 貝母 1.0	2g tid	治癰疽，發背 疔瘡，疔疔， 散瘀消腫，化 膿生肌。	陰證瘡瘍者不 宜。
1206 散腫潰堅湯 《蘭室秘藏》	柴胡 1.0 黃連 1.0 升麻 1.0 黃柏 1.0 葛根 1.0 龍膽 1.0 知母 1.0 當歸 1.0 天花 1.0 白芍 1.0 荊三 1.0 桔梗 1.0 菝葜 1.0 昆布 1.0 連翹 1.0 海藻 1.0 黃芩 1.0 炙甘 1.0	4g tid	消腫散結，破 潰排膿。治氣 毒瘰，馬刀， 結硬如石，已 破流膿水者。	
1321 當歸飲子 《證治準繩》	當歸 0.7 何首 0.7 生地 0.7 荊芥 0.7 川芎 0.7 防風 0.7 白芍 0.7 蒺藜 0.7 黃耆 0.2 甘草 0.2	2~3g tid	益氣活血，疏 風除濕。用於 枯燥與搔癢主 訴。乾性皮膚 病，皮膚搔癢 症，瘡疥，分 秘性少膿。	

(十三)祛風劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0414 天麻鈎藤飲 《雜病證治 新義》	天麻 1.2 川牛 1.6 鈎藤 2.0 杜仲 2.0 石決 4.0 桑寄 3.2 黃芩 1.2 夜交 4.0 山梔 1.2 茯神 2.0 益母 2.0	6g tid	平肝熄風，清熱活血，補益肝腎。眼暈，高血壓眩暈，面部肌肉痙攣。	舌降無苔之陰
1003 消風散 《外科正宗》	荊芥 2.5 防風 2.5 牛蒡 2.5 蒼朮 2.5 生地 2.5 當歸 2.5 石膏 2.5 知母 2.5 木通 1.3 苦參 2.5 胡麻 2.5 蟬蛻 2.5 甘草 1.3	10.5g tid	頭目昏痛，皮膚瘙癢，濕疹，蕁麻疹。	氣血虛弱者，不宜。
1019 桂枝芍藥知母湯 《金匱要略》	桂枝 4.0 白芍 3.0 知母 4.0 麻黃 2.0 防風 4.0 白朮 5.0 生薑 5.0 甘草 2.0 炮附 2.0	10.5g tid	肢節腫痛，關節炎。	
1605 獨活寄生湯 《千金湯》	獨活 3.0 寄生 2.0 人參 2.0 茯苓 2.0 甘草 2.0 生地 2.0 當歸 2.0 川芎 2.0 白芍 2.0 防風 2.0 秦艽 2.0 細辛 2.0 杜仲 2.0 牛膝 2.0 桂心 2.0	12g tid	腰腿拘急，筋骨攣痛，冷痺無力，屈伸不便，風寒濕痺。	◎孕婦慎用。
2103 蠲痺湯 《中國醫學大辭典》	薑黃 4.0 黃耆 4.0 羌活 4.0 防風 4.0 當歸 4.0 赤芍 4.0 炙甘 1.5 生薑 3.0 ⁵⁹ 大棗 2.0	12g tid	益氣和營，祛風除濕。筋痛，腰痛，四十腕，五十肩，痛風。	

(十四)明目劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0712 杞菊地黃丸 《中國醫學 大辭典》	枸杞 2.0 甘菊 2.0 熟地 8.0 山茱 4.0 山藥 4.0 茯苓 3.0 牡丹 3.0 澤瀉 3.0	12g tid	目赤腫痛，久視昏暗，迎風流淚，怕日羞明，頭暈。	忌食酸性及生冷食物

(十五)祛寒劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
0801 吳茱萸湯 《傷寒論》	吳茱 7.5 人參 4.5 生薑 9.0 大棗 6.0	9g tid	嘔吐，下痢，頭痛，煩燥，手足逆冷，涎沫，腸炎，習慣性頭痛，嘔吐等。	熱證嘔吐、頭痛、胃腹痛不宜。
1303 溫臑湯 (真武湯) 《傷寒論》	炮附 1.0 茯苓 5.0 白朮 4.0 芍藥 5.0 生薑 5.0	4.5g tid	手足寒冷，胃弱，腸炎，痢疾，濕疹等。	
1316 當歸四逆湯 《傷寒論》	當歸 3.5 桂枝 3.5 細辛 3.5 通草 2.5 芍藥 3.5 甘草 2.5 大棗 3.0	6g tid	傷寒，手足厥冷，脈細欲絕，腹中攣急，四肢酸痛，腰痛。	

(十六)清暑劑

方名	組成藥物/g	日用	臨床應用	注意事項
1111 清暑益氣湯 《脾胃論》	黃耆 3.0 升麻 3.0 葛根 1.0 人參 1.5 麥門 1.0 五味 0.5 當歸 1.0 陳皮 1.5 蒼朮 3.0 白朮 1.5 黃柏 1.0 青皮 1.0 澤瀉 1.5 神曲 1.5 甘草 1.0 生薑 3.0 大棗 2.0	12g tid	長夏濕熱起因之四肢困倦，無氣力，胸滿氣促，身熱心煩，下部膨悶，小便頻數，口渴不思飲食，自汗體虛。	素體氣虛並傷暑邪者較宜。
2002 藿香正氣散 《太平惠民和劑局方》	藿香 3.0 紫蘇 3.0 白芷 3.0 桔梗 2.0 厚朴 2.0 大腹 3.0 半夏 2.0 陳皮 2.0 茯苓 3.0 白朮 2.0 炙甘 1.0 生薑 3.0 大棗 1.0	9g tid	外感風寒，頭痛，惡寒，嘔吐，下痢，胸悶腹脹，夏季感冒。	陰虛火旺者不宜，忌生冷油膩。