

題數	Question	Answer
1	臺北市何時開打公費HPV疫苗？ 如果要接種公費HPV疫苗，需要帶那些資料？	(1)108年3月4日起可至本市公費HPV合約院所進行接種。 (2)人類乳突病毒疫苗 (HPV疫苗) 接種同意書暨評估單，家長及學生皆需簽名同意接種。 (3)人類乳突病毒疫苗 (HPV疫苗) 接種紀錄卡 (4)健保卡
2	臺北市公費HPV疫苗合約院所 有哪些？	院所名單(如附件1)請至臺北市政府衛生局官網主題/癌症防治/人類乳突病毒(HPV)疫苗接種服務專區查詢(網址： https://goo.gl/acwb2h)。
3	目前政府核准有哪幾種HPV疫苗廠牌？不同價數的HPV疫苗可交替接種嗎？其他種類疫苗可以和HPV疫苗同時接種嗎？	(1)目前全球共有3支疫苗上市，我國皆已核准上市，分別為(葆蓓)二價疫苗及(嘉喜)四價疫苗與九價疫苗。 (2)108年健康署採購疫苗為葆蓓二價疫苗。 (3)不同價數疫苗不建議交互接種，從第一劑至最後一劑應接種相同價數之疫苗。 (4)由於HPV疫苗是非活化疫苗，因此可和其他疫苗同時於不同部位接種。
4	若我為公費HPV疫苗接種對象，依衛生局(所)通知到合約醫療院所接種、或於看門診時順便接種，需要額外付費嗎？	(1)公費HPV疫苗接種對象，HPV疫苗費和接種處置費由政府提供，其餘掛號費需依各醫療院所規定。 (2)如為看門診時順便接種HPV疫苗，應依門診規定，自付看病之相關醫療費用，但醫療院所不得再向您收取接種HPV疫苗之疫苗費和接種處置費。
5	本市公費HPV疫苗接種對象、時間及接種幾劑？	(1)本市公費HPV疫苗接種對象為本國國籍且107學年度入學本市在校之國一女生，以學籍為施打對象。 (2)葆蓓人類乳突病毒2價疫苗，接種第一劑時年齡在9-14歲僅須接種二劑，滿15歲則須接種三劑(在第0、1 和6 個月接種)； (3)為達預期保護效力，建議滿14歲即日起至108年5月31日前完成第一劑接種，108年11月30日前完成第二劑接種。 (4)滿15歲建議洽就診院所醫師評估。
6	107年度公費HPV疫苗接種，是否強制接種？	沒有強制接種，接種須經學生及家長同意。
7	若未能按期程接種，該怎麼辦？	本市108年補助接種對象為本國107年度入學本市之國一女生，期程至108年12月。為達到預期之保護力，建議依期程於108年11月30日前將疫苗接種完畢。

題數	Question	Answer
8	政府採購之HPV疫苗品質是否有保障?是公費疫苗還是自費疫苗的保護效果好?	(1)政府採購提供的公費HPV疫苗均符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，每批疫苗經檢驗合格，取得許可證照。 (2)不論是公費或是自費HPV疫苗，均可預防HPV感染引起的子宮頸癌。
9	HPV疫苗對子宮頸癌的保護力是百分之百嗎? 保護效力能維持多久呢?	(1)接種疫苗只能預防部份型別的HPV病毒感染。視疫苗種類可預防約60-70%的子宮頸癌發生風險，無法百分之百預防子宮頸癌。 (2)即使接種疫苗，仍一定要做定期接受子宮頸抹片檢查。同時，應有安全性行為、戴保險套，這也是預防子宮頸癌的保護措施。 (3)因目前追蹤受試者的時限最長為約十年，尚無法證實接種HPV疫苗後可維持多長的保護效期。最新資料顯示四價疫苗保護力為至少8年，二價疫苗至少9.4年，但長期保護力仍須持續觀察方能確定。
10	HPV疫苗施打前，為避免接種疫苗可能發生的不良反應，應主動告知哪些事情，請醫師評估?	接種前必須先經醫師的評估診察，以確認接種者身體狀況，及是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種。 接種HPV疫苗前應事先告知醫師 (1)過敏史：包括藥物和食物。 (2)凝血功能障礙問題：因肌肉接種可能會造成出血的情況發生。 (3)免疫功能異常：包括免疫功能缺乏或正服用免疫抑制劑。 (4)任何身體的不適：如發燒、感染、正在服藥、皮膚傷口等 (5)已經懷孕或計畫懷孕。
11	哪些人不建議接種HPV疫苗?	(1) 接種HPV疫苗後出現過敏症狀者。 (2) 本身有特殊疾病史者(如：凝血性問題疾病、免疫功能異常或正服用免疫抑制劑)。 (3) 接種當天有發燒或感染症狀、或正在服藥等，接種前應告知醫生以進行評估 (4) 已懷孕者(目前為止，尚未發生HPV疫苗對母親或胎兒造成任何妊娠不良事件)。 (5) 有計畫懷孕者(在接種疫苗的六個月期間應避免懷孕)。
12	如果在接種當天感冒發燒，在體溫幾度內仍可以接種HPV疫苗?	建議耳溫槍溫度小於38°C可接種HPV疫苗。但接種前必須先經醫師的評估診察，再決定可否接種。
13	有使用抗血小板或抗凝血藥物 (如Aspirin、Warfarin、Clopidogrel、Ticlopidine) 者是否可採以肌肉注射接種HPV疫苗? 注意事項為何?	若非屬疫苗接種之禁忌症，建議可接種HPV疫苗，應列入醫師問診事項，於接種時使用23號或直徑更小的針頭，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

題數	Question	Answer
14	接種HPV疫苗可能有什麼副作用？如果出現副作用該怎麼辦？	<p>1、HPV疫苗接種後應注意注射部位是否有嚴重紅腫熱痛、發燒、心跳加速或血壓下降等身體不適症狀。</p> <p>2、接種子宮頸癌疫苗可能發生的不良反應：</p> <p>(1)較常見：注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢、發燒、頭痛、噁心、暈眩。</p> <p>(2)較少見：注射部位瘀傷、血腫、出血、腫塊、溫熱感、疲倦、腹瀉、口咽疼痛、肌痛、上腹痛、上呼吸道感染等。</p> <p>3、接種疫苗後，如有任何不良反應症狀，或發生嚴重或非預期之副作用：</p> <p>(1)請儘速前往醫療院所，並告知醫師您的疫苗接種史。</p> <p>(2)撥打24小時服務專線：0800-88-3513(寶貝，守護一生)</p> <p>(3)本市12區健康服務中心(如附件2)</p>
15	符合接種條件之對象，接種HPV疫苗之後出現副作用，可以尋求救濟嗎？	可以。發生疑似不良反應之情形，請即刻就醫，依傳染病防治法第三十條規定，申請預防接種受害救濟。相關規定由衛生福利部疾病管制署(http://www.cdc.gov.tw)管道方式尋求救濟。
16	接種HPV疫苗後，可否馬上離開接種地點？	不可以。建議至少應停留觀察30分鐘，觀察是否有出現接種後副作用。
17	如何預防暈針？如暈針該如何處理？	<p>(1)建議放鬆心情。</p> <p>(2)接種時宜採取坐姿，並於接種後坐或躺約30分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒及緩解情緒緊張，如暈針現象持續，應儘快通知醫療院所評估觀察。</p>
18	什麼是HPV(人類乳突病毒)？	<p>(1)人類乳突病毒(HPV)是一種DNA病毒，會感染人體的表皮與黏膜組織。它有一百多型，可以分為低危險型與高危險型，是男性及女性重要的性接觸傳染病原。</p> <p>(2)常見高危險型HPV病毒(HPV第16、18型)，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌以及男女外生殖器癌的發生有關，子宮頸癌有超過70%是由HPV第16、18型所引起的。</p> <p>(3)常見低危險型HPV病毒(HPV第6、11型)，若感染可能會引起生殖器疣(俗稱菜花)，但致癌機率相對較小。</p>
19	HPV(人類乳突病毒)與子宮頸癌的關係？	女性子宮頸的細胞因感染高危險型人類乳突病毒(HPV)，長期受到刺激而發生一連串的變化；正常健康的子宮頸細胞會因此而變得異常增生，而就有可能轉變為子宮頸癌細胞。
20	為何要施打HPV疫苗？	為了預防子宮頸癌的發生。子宮頸抹片檢查功能在於『早期發現』子宮頸癌早期治療，而HPV疫苗功能在於『預防』子宮頸癌的發生。

題數	Question	Answer
21	有可能因為接種HPV疫苗感染HPV嗎？ 若接種後發燒，是不是代表感染HPV？	(1)不會。HPV疫苗是由病毒的一部分蛋白空殼製成，不含病毒基因，所以接種疫苗不會感染HPV病毒。 (2)HPV疫苗是不活化疫苗，接種後不會造成HPV感染。若接種48小時後仍然持續發燒，應立即就醫。
22	HPV傳染途徑有那些？	人類乳突病毒(HPV)主要經由性接觸傳染。在性行為過程中，透過接觸皮膚、黏膜或體液而感染。有時，外部生殖器接觸帶有HPV的物品，也可能造成HPV。
23	誰容易感染HPV？感染HPV會有什麼症狀嗎？	HPV感染男女皆常見，伴侶性經驗較複雜、長期免疫力低落等情況，均可能增加HPV的感染風險。感染者一般沒有明顯症狀，通常9成的HPV感染會在1年內消失。部分感染者會出現菜花或其他生殖器病變，建議儘速就醫。
24	如何減少或避免HPV感染的發生？	(1) 性行為中全程使用保險套可以減少感染HPV的機會。 (2) 藉由維持良好生活作息以及充足營養，可維持較佳的免疫力，可使身體自動清除病毒，避免反覆受到感染。
25	感染HPV能夠治療嗎？	目前並無特定藥物可治療HPV感染。
26	如果大家都接種HPV疫苗，就會形成群體免疫，所以我不打疫苗也不會被傳染？	當群體免疫達到一定程度時，可以阻斷或減緩疾病的傳播。但群體免疫是需要時間累積，接種率要高達一定程度才會產生效益；主要是減少疾病傳播，且無法確定接觸對象是否已有免疫力，不會傳染別人。群體免疫並非表示不會被傳染，自身接種HPV疫苗才較能保障自己安全。
27	接受HPV疫苗接種後，是否還需要定期做子宮頸抹片檢查？	需要。因為人類乳突病毒(HPV)疫苗，依疫苗預防型別不同，理論上可以預防60-70%HPV感染，目前疫苗尚未涵蓋所有病毒型別，所以接受HPV疫苗接種後，仍須維持全程安全性行為，使用保險套及定期接受子宮頸抹片篩檢，以提供更完整的保護。
28	HPV疫苗能夠治療子宮頸癌、子宮頸癌前病變和生殖器疣(俗稱菜花)嗎？	不能。HPV疫苗是「預防性」疫苗，主要是藉由預防HPV病毒感染來預防子宮頸癌病變，並沒有「治療」效果。
29	接種HPV疫苗期間可以懷孕嗎？	接種HPV疫苗期間不建議懷孕。
30	接種HPV疫苗期間懷孕了怎麼辦？	若接種HPV疫苗期間意外懷孕，不須中止妊娠，但直至妊娠結束前，應暫緩HPV疫苗的接種。

題數	Question	Answer
31	接種紀錄卡遺失該如何辦理	請洽本市十二區健康服務中心補發,或臺北市民e點通網路申辦單一窗口網站(網址： https://ppt.cc/fC5nix)