

葉門—白喉

葉門疫情持續，自 2017 年 10 月迄今累計約 1,700 疑似病例，91 人死亡，WHO、UNICEF 等國際組織協助該國展開大規模的疫苗接種活動，以控制疫情傳播。

索馬利亞—小兒麻痺病毒

WHO 於 5/15 公布東非索馬利亞首都摩加迪休及肯亞首都奈洛比今年 3 月報告自環境樣本中檢出 cVDPV2 後，於 3/8-3/22 自索馬利亞南部巴納迪爾州環境樣本中再通報檢出 cVDPV3，惟兩國截至 5/8 自 AFP (急性無力肢體麻痺)病例及其接觸者均無檢出 cVDPV2、cVDPV3 病毒；WHO 將持續評估流行病學情況，並協助實行預防及因應措施。

剛果民主共和國—伊波拉病毒感染

WHO 非洲區署 5/14 更新剛果民主共和國西北部赤道省鄰近比科羅(Bikoro)地區疫情，4/4-5/13 累計 41 例(2 例確診、22 例極可能、17 例疑似)，包含 20 人死亡(CFR:48.8%)及 3 名醫護人員，病例分布於比科羅(Bikoro)、伊波克(Iboko)及萬佳達(Wangata)等 3 個區域，目前持續追蹤 432 名接觸者。

日本—麻疹

日本沖繩縣更新麻疹疫情，新增 1 例確診，為中部保健所管轄區內 10 多歲男性，感染源待調查，截至 5/15 共檢驗 513 例疑似病例，累計 99 例確診(含我國至沖繩旅遊病例)。

美國—瘧疾

美國 5/4 報告 1 名境外移入惡性瘧病例，經調查該名 54 歲個案 4/7-20 曾至哥斯大黎加西部蓬塔雷納斯省奧薩半島旅遊，返國 7 天後出現發燒、全身痠痛等症狀而就醫，現已康復；奧薩半島近 2 年無惡性瘧病例；美國 CDC 於 5/11 將哥斯大黎加瘧疾提升為旅遊疫情建議第二級：警示(Alert)。

秘魯—格林-巴利症候群(GBS)

秘魯今年 1-4 月累計 42 例，高於近 2 年同期(約 2 例)，當局已立即採取行動，將持續進行疫調以確定發生原因，並已備妥 GBS 緊急情況之相關因應措施。

馬來西亞—狂犬病

馬來西亞 5/4 公布砂拉越古晉新增 1 例狂犬病確診病例，為今年第 4 例，個案為 1 名 3 歲外國孩童，經調查曾於 4 月初被住家附近的流浪狗咬傷並就醫，5/3 因發燒 5 天再度就醫，隨後出現恐水、吞嚥困難等症狀，5/8 確診，現況危急；該國自 2017/6/30 截至 2018/5/10 累計 10 例，其中 8 人死亡。

英國—麻疹

英國公布今年截至 5/9 累計 440 例，多分布於首都倫敦、東南行政區及西米德蘭茲郡，當局表示病例增加原因，主要與遊客往返歐洲其他麻疹疫情持續國家有關；該國疫苗覆蓋率已達 95%，惟仍可在 MMR 接種率低之社區及未具免疫力族群間有限傳播。

烏干達—麻疹

烏干達衛生部宣布全國 26 個地區爆發麻疹疫情，其中以該國北部的阿穆魯區 (Amuru)，以及東部的卡穆利區(Kamuli)，姆巴萊區(Mbale)和比特博區(Butebo)最為嚴重，當局表示將對所有五歲以下兒童加強麻疹常規疫苗接種。

沙烏地阿拉伯—中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

沙烏地阿拉伯 5/4 新增 1 例病例，為東部省 66 歲男性原發個案，曾直接接觸駱駝，病況嚴重。該國迄今累計 1,838 例，744 例死亡。

巴西—麻疹

WHO 於 5/8 公布巴西發生麻疹疫情，已累計 693 例似病例，其中 103 例確診(2 例死亡)，確診病例中近 8 成分布於羅賴馬州，年齡介於 6 個月-30 歲，發病日介於 2/4-3/27，基因型均為 D8 型，與委內瑞拉 2017 年流行型別相同。當局已實施疫苗接種活動及接觸者之追蹤及監測，鑑於麻疹的高傳染力及該區各國執行常規免疫規劃與預防控制能力，WHO 評估國內及區域擴散風險為高。美洲地區於 2016 年 9 月宣布消除麻疹，但可能因輸入病例進而引發疫情，近期哥倫比亞、厄瓜多及秘魯病例均自委內瑞拉移入。