

到底該不該讓小孩接種流感疫苗？醫師告訴你！

疾病管制署表示，截至 11 月 25 日止，國內公費流感疫苗已施打 419 萬餘劑，今（27）日邀請臺大醫院小兒部李秉穎醫師說明嬰幼兒、學齡前幼兒及新手爸媽接種流感疫苗的重要性，隨著天氣轉涼，每年流感疫情會在新曆年到舊曆年之間達到高峰，呼籲尚未接種流感疫苗的公費對象儘快接種。

李秉穎醫師表示，嬰兒、未滿 3 歲及學齡前幼兒是流感的高風險族群之一，但出生 6 個月內嬰兒無法接種流感疫苗，需父母接種流感疫苗，來保護尚無法接種流感疫苗的嬰幼兒健康；也提醒家中有 6 個月以上嬰幼兒之家長，每年皆要帶小孩接種流感疫苗，另外強調，如果是首次接種流感疫苗的幼兒，接種完第 1 劑後，間隔 4 週需再接再種第 2 劑，才能產生足夠的保護力。呼籲尚未攜帶幼兒接種流感疫苗的家長，請儘快帶小孩前往接種，並請記得攜帶兒童健康手冊以利安排後續接種時程。

依據監測資料顯示，國內上週（11 月 18 日至 11 月 24 日）類流感門急診就診人次計 53,632，近 4 週持平，整體疫情仍處低點。另上週新增 3 例經審查與流感相關死亡病例，分別為中部 2 例、東部 1 例，年齡介於 60 多歲至 80 多歲，均有慢性病史，其中 2 人感染 H3N2、1 人感染 H1N1。今（2018）年自 10 月 1 日起累計 79 例流感併發重症病例，感染型別以 H3N2 為主（52 例，佔 66%），其中 8 例死亡（感染 H1N1 及 H3N2 各 4 例）；近 4 週社區同時流行 H3N2 及 H1N1 流感病毒。近期北半球溫帶地區國家流感活動度仍維持低水平，惟加拿大及韓國已高於流行閾值；各國檢出病毒型別以 H1N1 為主，惟韓國、新加坡為 H1N1 及 H3N2 共同流行。

疾管署再次呼籲，防範流感病毒侵襲，除了每年要按時接種流感疫苗外，平常也應落實勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如有類流感症狀應配戴口罩儘速就醫，並落實生病在家休息；一旦出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，應儘速至大醫院接受治療。如有流感相關疑問，可至疾管署全球資訊網「流感專區」（<https://www.cdc.gov.tw>），或撥打免付費防疫專線 1922（或 0800-001922）洽詢。