



Actein Effervescent Tab 600mg (愛克痰 發泡錠)

學名：

Acetylcysteine

用途：

減少呼吸道黏膜分泌的黏稠性，蓄意或偶發之 Acetaminophen 中毒之解毒劑。

使用方法：

- 1) 一次服用發泡錠一片，一天一至二次(最好在晚上服用)。
- 2) 請將發泡錠置於玻璃杯中，加入適量水 (200CC 以上)溶解，混勻直接飲用。
- 3) 本藥須由醫師處方使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 本藥可能有硫臭味，此為主成分特有味道，請放心使用。
- 2) 氣喘患者使用本藥請小心，如發生支氣管痙攣請立即停藥。

三軍總醫院 祝您健康快樂



可能的副作用：

本藥口服，偶爾發生胃腸障礙如噁心或嘔吐，極少出現諸如皮疹或支氣管痙攣等過敏反應。

禁忌：

本品含阿斯巴糖，苯酮尿患者請勿使用。

可能引起之藥物交互作用：

Acetylcysteine 與許多抗生素不能配合，如 tetracyclines, amphotericin B, sodium ampicillin, erythromycin, 它們不能同時服用。

若您有任何服藥之問題，請告知您的醫師或詢問藥師

三軍總醫院澎湖分院臨床藥事科製作

(06)921-1116 轉 59130

三軍總醫院 祝您健康快樂