



支氣管鏡檢查

所謂支氣管鏡檢查，是以一支直徑約0.5公分的軟式管子，由鼻或口放入氣管及支氣管中，醫師可以經此支氣管鏡收集組織檢體，以診斷肺部疾病及評估出血部位，也可以藉此做治療，例如：除去異物、抽痰、給藥及切片等。

一、檢查前準備

- (一)填寫「特殊檢查(處置、治療)同意書」。
- (二)檢查前禁食(亦不能喝水)4~6小時。
- (三)檢查前半小時注射藥物，使痰液分泌減少，以利於檢查。
- (四)若有活動假牙，必須先取下假牙，以免發生危險。
- (五)檢查前於口咽噴麻醉劑，以減輕因檢查時所造成的不適。

二、檢查時注意事項

- (一)檢查時給予100%氧氣，持續監測血氧，維持血氧濃度在95~100%。
- (二)檢查時採平躺，會以治療巾蓋住病人眼睛，避免在執行檢查時病人焦慮害怕。

三、檢查後注意事項

- (一)檢查後繼續禁食1~2小時後，可先喝水測試吞嚥功能如果不會噎到時，方可進食。
- (二)檢查完若痰中帶少量血絲，此為正常現象，但仍請告知醫護人員，以利醫護人員評估。
- (三)若有大量咳血、呼吸困難及劇烈胸痛，請立即告知護理人員。

參考資料

- 翁皎正、翁淑娟、黃嫦芳、程紋貞、林麗味、趙淑美等(2009)·*內外科護理技術*(第四版)·台北：新文京開發。
- 三軍總醫院護理部(2012)·*護理部護理技術手冊*·台北：三軍總醫院護理部。
- 林貴滿等合著(2013)·*內外科護理技術*(第七版)·台北：華杏。