



小量噴霧劑(Ventolin)藥物使用之護理指導

一、適應症

- (一)支氣管痙攣疾患之預防與治療。
- (二)支氣管氣喘。
- (三)阻塞性支氣管炎。

二、用量

每4~6小時使用一支吸入液，一天不超過12支。

三、用法

- (一)將噴霧器正確組合，並與氧氣導管接妥。
- (二)將醫師處方開立之藥物用量，依醫囑稀釋或混合溶液，倒入噴霧杯內。
- (三)將咬嘴放入口中，打開氧氣流量表至5L/min以上。
- (四)緩慢由口呼吸，中間加幾次深呼吸，且每次深呼吸後，閉氣4~5秒。
- (五)於噴霧治療過程中，用手握住噴霧杯，勿傾倒以增進藥物之吸收，並不時輕拍噴霧杯，使杯內壁上的藥劑完全被吸入。

四、副作用

偶有肌肉顫動的情形；如果使用過量，會有心跳加快的反應。

參考資料：

陳夏蓮、葉明珍(2015)·呼吸系統疾病病人之護理·於胡月娟總校閱，內外科護理學(上冊)(五版，1214-1217頁)·臺北市：華杏。

國家網路藥典(無日期)·小量噴霧劑·取自

<http://hospital.kingnet.com.tw/medicine/medicine.html?medno=us5eEU2W6U2U>