



定喘樂定量噴霧液藥物使用之護理指導 (Atrovent, 藥瓶包裝呈綠色)

一、適應症

慢性阻塞性支氣管炎、支氣管氣喘。

二、用量

(一)間歇性及長期治療：依醫囑每日使用數次，每次2個定劑量。

(二)突然發作時的治療：需先用2~3定劑量，2小時後可再吸一次，若效果不佳，則需立即就醫。

三、用法

(一)將吸入輔助器與噴霧液含口器及護蓋連接妥當，如圖一。


(二)使用前先上下搖動噴霧器，如圖二。

(三)用藥前可經由鼻子平靜的呼氣，如圖三。


(四)以食指下壓噴霧器罐底一下後放鬆，以將一次用藥量送入輔助器備用，如圖四。

(五)移去護蓋，並立刻以正常呼吸速度從吸入輔助器之一端，由口吸入，如圖五。

(六)每次吸入藥物後，即閉氣5~10秒再吐氣，如圖六，使藥物能在肺部均勻分佈。




圖一




圖二



圖三




圖四



圖五



圖六



四、使用注意事項

- (一)每次劑量超過兩個定劑量以上時，每口之間至少需要間隔一分鐘以上。
- (二)使用噴霧器時，容器底部應朝上(倒立)，以便於準備用藥時，一次用藥量能充份進入輔助器中。
- (三)噴嘴部份及含口器，應常用清水沖洗。
- (四)含口器噴射口若有阻塞，可用細針清潔噴口。

五、副作用

沒有全身性的副作用，但少數病人可能會有鼻乾或口乾的局部反應。

參考資料：

陳夏蓮、葉明珍(2015)·呼吸系統疾病病人之護理·於胡月娟總校閱，內外科護理學(上冊)(五版，1214-1217頁)·臺北市：華杏。

國家網路藥典(無日期)·小量噴霧劑·取自

<http://hospital.kingnet.com.tw/medicine/medicine.html?medno=us5eEU2W6U2U>