



# 無痛鏡檢麻醉衛教單

隨著麻醉技術及藥物的進步，進行鏡檢時，可以不再像過去一樣，需要忍受緊張、恐懼與疼痛的過程。本院麻醉科，可提供無痛鏡檢麻醉的服務。病人可在妥善的照顧下，接受檢查。

## 一、無痛鏡檢流程

進行的流程為，首先會有醫護人員為您打上點滴，並簽署麻醉同意書。進入恢復室後，會先幫您裝上監視儀器，在開始鏡檢前，麻醉醫師從點滴中，注入適當劑量的麻醉藥，讓您進入麻醉狀態。檢查過程中，麻醉醫護人員，會隨時監測您的心跳、血壓及血中氧氣濃度，以確保麻醉安全。鏡檢完成後，您很快就會醒來。之後，大約在經過半個多小時的休息，就可以離開。但務必要注意，離開醫院時，您需要有行為能力的家人或朋友的陪伴，同時為了您的自身安全，建議您不要自己開車或騎車。

## 二、麻醉的風險不可不知

任何人接受麻醉，都有一定的風險，嚴重的包括心肌梗塞、中風等，但發生機率很低，當接受麻醉者年齡過大，或本身健康狀態不佳(例如：有肺病、糖尿病、高血壓、心臟病或尿毒症等慢性內科疾病)時，會增加麻醉的風險，若您有下列的情形時，請事先告知麻醉醫師：

- (一)未禁食 8 小時以上。
- (二)六個月內曾罹患心肌梗塞。
- (三)不穩定的心絞痛。
- (四)嚴重心律不整。
- (五)重度慢性肺病或處於急性發作期。
- (六)呼吸道構造異常。
- (七)一個月內曾發生過中風。
- (八)對麻醉藥過敏。
- (九)有其他系統疾病，曾經過麻醉醫師評估，有高麻醉風險。

## 三、無痛鏡檢麻醉後，可能發生的併發症有：

- (一)噁心、嘔吐(發生率 3-5%)。
- (二)頭暈(發生率 3-5%)。
- (三)吸入性肺炎(發生率小於 1%)。
- (四)藥物過敏(發生率小於 1%)。

雖然上列所述併發症有可能發生，但其發生率很低。基於告知義務及顧客或病人知的權利，仍於此提供說明。若有任何麻醉相關問題，請於鏡檢前，詢問麻醉醫師。

## 參考文獻

陳應麟(2010)·*麻醉護理手冊*(1050-1055)·中國·九州。