



## 靜脈注射泌尿系統攝影檢查

所謂靜脈注射泌尿系統攝影檢查乃是經由靜脈注入顯影劑，由X光照像測知泌尿系統有無異常現象。從靜脈注射泌尿系統攝影檢查可知腎臟、腎盂、輸尿管及膀胱的位置形狀、大小及腎臟排泄功能，亦可檢查泌尿系統是否有結石、水腫及腫瘤。

### 一、檢查前準備

- (一)曾經對顯影劑或貝、蝦、蟹等食物有過敏反應者，尤其是曾發生嚴重症狀，如休克、心律不整、呼吸困難、肺水腫…等過敏病史者或有懷孕可能，請告知醫護人員。
- (二)填寫檢查同意書。
- (三)檢查前一天少吃高渣的食物，例如：芹菜，禁食固體食物及禁服不透光藥物，如鐵劑。
- (四)檢查前晚晚餐後服用軟便劑，同時飲用開水1000mL，而半夜12點後禁食勿再吃任何東西(包括開水)，由於軟便劑會有腹瀉情形，以便排空腸道，幫助X光照像。

### 二、檢查中注意事項

檢查過程必須先照一張腎臟、輸尿管、膀胱的X光片，再靜脈注射顯影劑(含碘)，依注射後5分鐘、10分鐘、30分鐘分別照X光片，並可能依每位病人不同的病情需要加照不同體位或延長時間、解尿後等X光片。全程約30~40分鐘。檢查中、檢查後注意若出現皮膚癢、呼吸困難等情形，請告知工作人員。

### 三、檢查後注意事項

- (一)多飲水，多翻身活動，促進顯影劑排出體外。
- (二)身體有任何不適反應，請立即告知我們，以便處理。
- (三)建議檢查結束後，休息十分鐘左右，無任何不適感才離開檢查室。

### 四、參考文獻：

馮容芬、李惠玲、吳麗彬、周繡玲、袁素娟、胡月娟、李嘉蕙、謝珮琳、楊玉娥、陳宇平、李和惠、尹裕君(2009)．成人內外科護理．台北市：華杏。