



前置胎盤

一、何謂前置胎盤？

指胎盤位置在子宮下段距內口4公分以內的區域，懷孕末期陰道出血、無腹痛收縮、無胎動變化。

二、原因

- (一)不明。
- (二)多胎妊娠。
- (三)高齡產婦。
- (四)子宮纖維瘤。
- (五)子宮位置不正常。

三、分類

- (一)完全性前置胎盤：即胎盤將子宮頸內口完全覆蓋。
- (二)部份性前置胎盤：胎盤一小部份蓋住子宮頸內口。
- (三)邊緣性前置胎盤：胎盤的邊緣和子宮頸內口很接近但未蓋住。

四、臨床表徵

- (一)如果發生大量陰道出血，通常是在懷孕28週以後。
- (二)沒有腹痛的產生。
- (三)鮮紅色的陰道出血。
- (四)胎心音大多能聽到，除非是大出血發生休克，導致胎心音變化。

五、處理

- (一)住院；禁止陰道檢查，用超音波測胎兒大小。
- (二)絕對臥床休息，注意血壓監視。
- (三)胎盤位置之測定。
- (四)胎兒已成熟或持續性嚴重出血，應行剖腹產終止妊娠，並視情況輸血。
- (五)懷孕30週以前發現前置胎盤，到產時只有不到6%仍是前置胎盤，若無出血現象，只要定期超音波追蹤檢查。