



Cordarone Tab 200 mg

(臟得樂錠)

學名：Amiodarone HCl 錠

商品名：Cordarone Tab 200 mg (賽諾菲安萬特)

中文名：臟得樂錠

藥品外觀：白色圓錠，一面有一字刻痕及「200」的字樣。

用途：治療某些心跳過快之心律異常。

使用方法：

- 1) 請固定與食物併服(飯後立即服用)或固定空腹(飯前1小時或飯後2小時)服用。
- 2) 實際用法用量請遵醫囑使用。

忘了用藥怎麼辦？

想起時請盡快補服；但若已接近下一次服藥時間，則跳過此次，到下次原本預定服藥的時間再服藥，不可一次服用雙倍以上劑量。

注意事項：

- 1) 若您有下列狀況，不可使用本藥：曾經對本藥主成份 amiodarone、碘或其他成分過敏；有嚴重的竇房結功能問題；有2級或3級的心臟傳導阻滯問題；曾經因心跳過慢暈倒；心因性休克。
- 2) 若有下列情況，請確認已先告知您的醫師：有心臟疾病(例如充血性心衰竭)、肝臟疾病或呼吸、肺部疾病；眼睛或視力方面的問題；有甲狀腺問題；曾經有嚴重過敏反應；血壓過高或過低；血鉀或血鎂過低；準備接受麻醉或手術；懷孕、預備懷孕或授乳。
- 3) 請您將目前使用的藥品(包括市售成藥、各類營養食品以及中草藥等)告知醫師。尤其是服用其他抗心律不整藥(如：sotalol、quinidine)、fluoroquinolone類抗生素(如：ciprofloxacin、levofloxacin、mexifloxacin)、抗精神病用藥(如：chlorpromazine、thioridazine、trifluoperazine、amisulpride、sulpiride、droperidol、haloperidol、quetiapine)、抗瘧藥(如：mefloquine、quinine)、抗排斥用藥(cyclosporin)、鈣離子阻斷劑(如：diltiazem、verapamil)等藥品。這些藥物與本藥併用會互相影響療效或增加副作用的嚴重度，請務必先告知醫師，讓醫師確認藥品如何開立。
- 4) 本藥可能會引起頭暈，在不確定本藥對您造成的影響前，請避免從事需專注力及協調力的活動，例如開車或操作危險器械。
- 5) 服藥治療期間避免飲用葡萄柚汁或葡萄柚。因葡萄柚會抑制本藥代謝，導致本藥血中濃度大量提升而增加副作用發生機率及嚴重度。

三軍總醫院 祝您健康快樂



- 6) 本藥可能增加皮膚對紫外光之敏感度而導致皮膚紅腫等反應，建議您於服藥期間到停藥後數個月，勿於陽光下曝曬或曝露於人工紫外光下，並做好防曬措施。
- 7) 本藥內含乳糖，若您有先天性半乳糖血症、葡萄糖或半乳糖吸收不良或乳糖酵素缺乏的情形，請務必告知你的醫師。
- 8) 使用本藥治療期間，醫師會幫您安排定期檢查，如：肝功能、甲狀腺功能、眼睛或血液學檢查等，請務必在醫師為您安排的時間接受檢查。

可能的副作用：

副作用不一定會發生，但仍提醒您注意：

- 1) 下列為較常發生但較不嚴重的副作用，若發生，請於回診時告知醫師；但若症狀持續、加重，或已造成您的困擾，請提前回診告知醫師：
 - 眼睛乾澀、輕微的噁心、嘔吐、腹痛、便秘、疲倦或虛弱、頭髮變少或睡眠障礙。
- 2) 若您於服藥期間，發生下列罕見但較嚴重的副作用，請盡快就醫：
 - 過敏反應：手、腳或腳踝、臉、嘴唇、舌頭及喉嚨發生腫脹，甚至造成胸悶、呼吸困難、刺痛。
 - 意識不清、虛弱、呼吸急促、手腳或嘴唇感到麻木或刺痛。
 - 暈倒或是嚴重頭暈。
 - 視力模糊、有光暈或感覺畏光。
 - 脖子變粗、變腫。
 - 胸痛（可能是疾病本身的症狀而非藥品副作用）。
 - 心跳太慢、太快或是不規則或心跳症狀沒有改善。
 - 眼白、皮膚變黃、深色尿或灰白色糞便。
 - 手、腳踝或足部出現腫脹。
 - 震顫。
 - 身上異常出血或瘀青。
 - 體重快速增加或減少。
- 3) 如果您發現上述未提及之副作用，且認為可能是本藥所造成，請於回診時告知醫師。

保存方法：

- 1) 請您將本藥連同藥袋儲存於室溫陰涼乾燥環境，避免潮濕及陽光直射，不需冷藏或冷凍。
- 2) 請將藥品放置於兒童無法觸及處，以免造成誤服。
- 3) 請勿將藥品提供給他人使用。
- 4) 請於醫囑治療期間使用藥品，勿使用過期藥品。
- 5) 過期或不需使用的藥品勿直接丟棄於家用垃圾內，可詢問藥師如何處理。

三軍總醫院 祝您健康快樂